

尾林 紗弥香 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨

## 題 目

Stathmin1 expression is associated with aggressive phenotypes and cancer stem cell marker expression in breast cancer patients

(Stathmin1発現は乳癌における悪性度と癌幹細胞マーカー発現に関連している)

International Journal of Oncology 51: 781-790, 2017

Sayaka Obayashi, Jun Horiguchi, Toru Higuchi, Ayaka Katayama, Tadashi Handa, Bolag Altan, Tuya Bai, Pinjie Bao, Halin Bao, Takehiko Yokobori, Masahiko Nishiyama, Tetsunari Oyama, Hiroyuki Kuwano

## 論文の要旨及び判定理由

### 1) 背景と目的

Stathmin1 (STMN1) はoncoprotein18としても知られているリン酸化タンパクで、リン酸化依存的に微小管を脱重合させることで細胞分裂を調節している。STMN1はこれまでに乳癌を含む様々な癌腫で癌進行、予後、薬剤抵抗性に関与することが報告されてきた。しかし、癌幹細胞 (Cancer stem cells: CSCs) とSTMN1との関連はこれまで明らかになっていない。本研究では、乳癌患者におけるSTMN1発現と病理組織学的因子、癌幹細胞マーカーとの関連について検討した。

### 2) 研究方法

1999年1月から2010年10月の期間に群馬大学医学附属病院乳腺外科で手術を施行した遠隔転移症例を除く原発性乳癌患者237例を対象とした。乳癌手術検体のホルマリン固定パラフィン包埋切片を用いて、Tissue microarrayを作成し、STMN1の免疫染色を行った。STMN1発現と、臨床病理学的因子、CSCsマーカー、EMTマーカーとの関連を調べた。

### 3) 結果

STMN1低発現群は171例 (72.2%)、STMN1高発現群は66例 (27.8%) であった。STMN1高発現群では、有意に核グレード高値 ( $P<0.001$ )、Ki67高値 ( $P<0.001$ )、ER陰性 ( $P<0.001$ )、PgR陰性 ( $P=0.002$ ) の症例が多く認められた。さらに、STMN1高発現群では、CD44陽性例 ( $P<0.001$ )、CD24陰性例 ( $P<0.001$ ) が多く、CSCsマーカーと関連が認められた。また、STMN1高発現群では、上皮系マーカーであるE-cadherin陽性 ( $P=0.009$ ) とEpCAM陽性 ( $P<0.001$ ) が多く、さらに間葉系マーカーであるvimentin陽性 ( $P<0.001$ ) も多かった。

### 4) 考察

これまでの報告と同様に、STMN1発現は、核グレード、TNBCs、Ki67発現と関連が認められた。さらに、STMN1発現はCSCsマーカーであるCD44陽性/CD24陰性とも関連していた。CSCsは、自己複製能と多分化能を持つ細胞であり、様々なメカニズムにより治療抵抗性を示し、癌の再発・転移に関連していることが示されている。上皮間葉転換 (EMT) も癌の進行や転移に重要な役割を果たしており、癌細胞はEMTにより細胞接着を喪失し、浸潤能

を増強し、脈管侵襲を介し、他臓器転移を起こすことが知られている。CSCsとEMTとの関連については、まだ明らかになっていない点も多い。これまでの報告によると、自己複製能により細胞増殖を担う上皮系幹細胞のnon-EMT CSCsと、浸潤・転移を担う間葉系幹細胞のEMT-CSCsの二つのCSCsの存在が示唆されている。今回の検討では、STMN1とCSCsとの関連は示唆されたが、STMN1は上皮系マーカーと間葉系マーカーのいずれとも関連しており、STMN1発現ではnon-EMT CSCsとEMT CSCsとを区別することはできなかった。しかし近年、上皮系マーカーと間葉系マーカーの両方を発現するCSCsの存在も指摘されてきており、STMN1はそのようなEMTとnon-EMTの中間タイプのCSCsのマーカーとなり得るかもしれない。

#### 5) 結語

乳癌におけるSTMN1発現は、癌の増殖能、TNBCサブタイプ、CSCsマーカーと強く関連しており、悪性度予測に有用である。

本研究により、乳癌におけるSTMN1発現は、癌の増殖能、TNBCサブタイプ、CSCsマーカーと強く関連しており、悪性度予測に有用であることが示され、今後の臨床応用ならびに更なる研究の発展に寄与すると考えられ、博士（医学）の学位に値するものと判定した。

（平成29年9月1日）